

## Mésange boréale (*Parus montanus*)

### Description


Calotte noir mat, joues blanches, bavette noire assez étendue (varie selon la période de l'année), haut du dos gris, ailes sombres avec une zone claire (critère), dessous blanc cassé.



### Répartition

#### Monde :

Occupe une vaste zone située entre le grand quart nord-est de la France et le nord de la Scandinavie et de la Russie.



(source : UICN)

## **France :**

La Mésange boréale occupe le quart nord-est du pays. On constate un déclin en France comme en Europe depuis les années 1980 (-63 % en Europe entre 1980 et 2012 ; -31 % en France de 1989 à 2013). Ces déclins pourraient être attribués en partie au changement climatique entraînant l'avancée des dates de pontes mais également aux pratiques sylvicoles entraînant une dégradation des habitats forestiers (diminution de la strate arbustive en sous bois, raréfaction du bois mort...). On constate ainsi une contraction de son aire de distribution vers l'est du pays. La Mésange boréale est désormais en voie d'extinction en Normandie comme en Île-de-France (Atlas des oiseaux nicheurs de France, Issa et Muller, 2015).

## **Picardie :**

L'espèce est présente dans les 3 départements picards mais semble moins abondante sur une frange ouest de la Somme et de l'Oise.

En réaction du changement climatique il est possible que cette espèce septentrionale se réfugie vers le nord est de l'Europe.

## **Habitats en Picardie**

---

La Mésange boréale occupe les forêts de feuillus et forêts mixtes, à condition que le sous-bois soit dense. Elle fréquente essentiellement les boisements humides où sont présents des arbres morts, mais aussi les fourrés et les bosquets.

Elle est présente toute l'année en Picardie.

## **Période de prospection**

---

Février - **mars – avril** – mai

## **Conditions d'observation**

---

Pas de précipitations

Vent faible à nul

Matinée ensoleillée

## **Méthode de prospection**

---


1 point d'écoute de 30 minutes dans les bois humides et frais en vallée.

2 passages par an (mars-avril)

## **Sites**

---

L'espèce est à rechercher en priorité à l'ouest de la Picardie dans les bois de la vallée de la Somme en aval d'Amiens, vallée d'Authie, vallée de l'Ancre, littoral, vallée de la Bresle, vallée du Thérain...



Carte de chaleur mettant en valeur les densités les plus importantes de citation de l'espèce en base clicnat (<http://clicnat.fr>).



**PICARDIE NATURE**

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l'aide de différents partenaires dont :

